

Форма



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

**Регистрационное удостоверение
лекарственного препарата для ветеринарного применения**

№ 003349

Номер регистрационного удостоверения:

616-3-13.15-2936.№ПВИ-3-8.0/03251

Дата государственной регистрации « 31 » декабря 20 15 г.

Наименование и адрес держателя или владельца регистрационного удостоверения
лекарственного препарата: "Grabikowski-Grabikowska P.P.H.U. "INEX" sp.j."

11-500 Gizycko, ul. Bialostocka 12, Poland

Наименование и адрес юридического лица-разработчика лекарственного препарата:

"Grabikowski-Grabikowska P.P.H.U. "INEX" sp.j." 11-500 Gizycko, ul. Bialostocka
12, Poland

Торговое наименование лекарственного препарата: Инфлоркс 10%

Международное непатентованное, или группировочное, или химическое
наименование лекарственного препарата: энрофлоксацин

Лекарственная форма: раствор для орального применения

Дозировка: 100 мг

Регистрационное удостоверение выдано бессрочно, со сроком действия 5 лет
(нужное подчеркнуть)

Заместитель Руководителя
(должность)



Е.А. Непоклонов
(Ф.И.О.)

М. П.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя

Россельхознадзора



А. НЕПОКЛОКОВ
31.12.2015

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Инфлоса 10%

с лечебной и лечебно-профилактической целью при болезнях бактериальной и микоплазменной этиологии у свиней и сельскохозяйственной птицы

(Организация-разработчик: «Grabikowski-Grabikowska P.P.H.U. «INEX» sp.j.»,
11 - 500 Gizycko, ul. Bialostocka 12, Poland./ «Грабиковски-Гарбиковска П.П.Х.У. «ИНЕКС»
сп.я., 11-500 Гижицко, ул. Бялостоцка, 12, Польша)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Инфлос 10% (Inflix 10%).
Международное непатентованное наименование: энрофлоксацин.
2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.
Инфлос 10% в качестве действующего вещества содержит: энрофлоксацин – 100 мг/мл и вспомогательные вещества: гидроксид калия, трилон Б и воду очищенную.
3. По внешнему виду Инфлос 10% представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета.
Срок годности Инфлоса 10% при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток.
Инфлос 10% запрещается применять по истечении срока годности.
4. Инфлос 10% выпускают расфасованным по 100 и 1000 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные навинчиваемыми крышками. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.
5. Инфлос 10% хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C.
6. Инфлос 10% следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Инфлос 10% относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы фторхинолонов.

10. Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антибактериального действия, основанного на подавлении репликации бактериальной ДНК. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов в том числе *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella* sp., *Pasteurella* sp., *Klebsiella* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *Campylobacter* spp., *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix* spp., *Proteus* spp., *Mycoplasma* spp., *Brucella canis*, *Actinobacillus* spp., *Listeria monocytogenes*, *Haemophilus* spp., *Clostridium* spp.

При оральном применении энрофлоксацин быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей организма. Максимальная концентрация энрофлоксацина в крови достигается через 1 – 2 часа и сохраняется до 6-7 часов, терапевтическая концентрация сохраняется на протяжении 24 часов. Энрофлоксацин частично метаболизируется в печени с образованием активного метаболита ципрофлоксацина; выводятся фторхинолоны из организма преимущественно с мочой и желчью.

Инфлоркс 10% по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Инфлоркс 10% назначают свиньям, цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур до 16-недельного возраста и индейкам с лечебной и лечебно-профилактической целью при респираторных болезнях бактериальной и микоплазменной этиологии, колибактериозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, некротическом энтерите, гемофилёзе, микоплазмозе, а также при ассоциативных и вторичных инфекциях, при вирусных болезнях, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к фторхинолонам, тяжелые поражения печени и почек. Не допускается применение препарата при существенных нарушениях развития хрящевой ткани, поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами. Запрещается применение препарата курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, ввиду накопления энрофлоксацина в яйцах.

13. Инфлоркс 10% применяют животным с водой для поения в течение 3-5 суток: свиньям в дозе 0,5 мл на 10 кг массы животного; птицам - 5 мл на 10 л воды. При сальмонеллезе, ассоциативных инфекциях и хронических формах заболеваний птиц препарат применяют в двукратной терапевтической дозе в течение 5 суток.

В период лечения птицы должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объёме, рассчитанном на потребление птицами в течение суток.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, угнетенное состояние, рвота, диарея. В этом случае следует отменить применение Инфлоркса 10% и провести симптоматическое лечение.

15. Особностей действия при первом приеме препарата и при его отмене не выявлено.

16. Не следует применять Инфлоркс 10% свиноматкам в период беременности.

17. Следует избегать пропусков очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

18. При применении Инфлоркса 10% в соответствии с инструкцией побочных реакций и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты.

19. Не допускается одновременное применение Инфлоркса 10% с бактериостатическими антибиотиками (хлорамфениколом, тетрациклинами, левомицетином и макролидами), ионофорными кокцидиостатиками, теофиллином, нестероидными противовоспалительными средствами и непрямыми антикоагулянтами. Совместный прием с железосодержащими и антацидными лекарственными средствами, содержащими Mg^{2+} , Ca^{2+} , Al^{3+} , приводит к снижению всасывания энрофлоксацина, поэтому Инфлоркс 10% следует назначать за 1-2 часа до или через 4 часа после приема вышеуказанных средств.

20. Убой свиней на мясо разрешается не ранее чем через 14 суток, птиц – не ранее чем через 11 суток после последнего применения Инфлокса 10 %. В случае вынужденного убоя животных ранее указанных сроков, мясо может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

21. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Инфлокса 10% следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы с лекарственным препаратом следует тщательно вымыть руки с мылом.

23. Людям с повышенной чувствительностью к энрофлоксацинам следует избегать прямого контакта с Инфлоксом 10%.

При случайном попадании препарата в глаза или на кожу их следует немедленно промыть струей чистой воды. В случае появления аллергических реакций или при попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Biofaktor Sp z.o.o., ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice, Poland/ Биофактр Сп. З.о.о., ул. Чиста, 4, 96-100 Скиернивице, Польша

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

Biofaktor Sp z.o.o., ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice, Poland/ Биофактр Сп. З.о.о., ул. Чиста, 4, 96-100 Скиернивице, Польша

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Инфлокса 10%, утвержденная Россельхознадзором 19 ноября 2010 года.

Номер регистрационного удостоверения 616-3-13.15-29362724-3-8.0/03251


СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору


А. НЕПОКЛОНОВ
31.12.2015

УТВЕРЖДАЮ
Представитель «Grabikowski-Grabikowska
P.P.H.U. «INEX» sp.j.»
в Российской Федерации


Кiryukhina H. G.
Grabikowski-Grabikowska P.P.H.U. «INEX» sp.j.
ul. Białostocka 12
11-500 Olsztyń, ul. Białostocka 12
tel. Max 4263586; 4261719
fax 426 000-72-39

Макет этикетки первичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата
для ветеринарного применения Инфлоркс 10% (фасовка 1000 мл)



ИНФЛОКС 10%

энрофлоксацин

**Раствор для орального применения
с лечебной и лечебно-профилактической
целью при болезнях бактериальной и
микоплазменной этиологии у свиней и
сельскохозяйственной птицы**

Хранить в закрытой упаковке
производителя, отдельно от пищевых
продуктов и кормов, в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей месте при
температуре от 5°C до 25°C.
Хранить в местах, недоступных для
детей!
Не применять по истечению срока
годности!
Условия отпуска: без рецепта
ветеринарного врача

Сери́я №:
Иден дэ:

1000 мл

Для ветеринарного применения

Организация-производитель:
ООО «Биофактор»- ул. Чыста 4, 96-100 Скерневице, Польша
Biofaktor Sp z o.o., ul. Czysta 4, 96-100 Skierzwice, Poland.
Tel. +48-46-832-45-40

Номер регистрационного удостоверения:

Размер этикетки упаковки по 1000 мл	118 x 170 мм
-------------------------------------	--------------

Вторичная упаковка лекарственного препарата для ветеринарного применения
Инфлоркс 10% (фасовка 1000 мл) не предусмотрена



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору



УТВЕРЖДАЮ
Представитель «Grabikowski-Grabikowska
P.R.N.U. «INEX» sp.j.»
в Российской Федерации

Кирюхина Н. Г.
11-000 Citysko, ul. Blakotocia 10
11-000 Max 4263580, 4201710
11-000 000-72-30

Макет этикетки первичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата
для ветеринарного применения Инфлоркс 10% (фасовка 100 мл)

Состав:
Действующее вещество: энрофлоксацин – 100 мг/мл
Вспомогательные вещества - до 1 мл.


Порядок применения: с водой для поения
в течение 3-5 суток: свиньям в дозе 0,5 мл на 10 кг
массы животного; птицам - 5 мл на 10 л воды.
При сальмонеллезе, ассоциативных инфекциях
и хронических формах заболеваний птиц препарат
применяют в двукратной терапевтической дозе
в течение 5 суток.
В период лечения птицы должны получать только
воду, содержащую лекарственный препарат.
Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме,
рассчитанном на потребление птицами в течение
суток.

**Перед применением препарата ознакомьтесь
с инструкцией**

ИНФЛОКС 10%
энрофлоксацин
Раствор для орального применения
с лечебной и лечебно-профилактической целью
при болезнях бактериальной и микоплазменной
этиологии у свиней и сельскохозяйственной птицы
Для ветеринарного применения

Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей месте при температуре
от 5°C до 25°C.
Хранить в местах, недоступных для детей!
Не применять по истечению срока годности!
Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача

Серия №: 
Годен до: 

100 мл
inex Номер регистрационного удостоверения: 

5 903874 904915

Организация-производитель: ООО «Биофактор» ул. Чыста 4, 96-100 Скерневице, Польша
Biofaktor Sp z o.o., ul. Czysta 4, 96-100 Skiernewice, Poland. Tel.+48-46-832-45-40.

Размер этикетки упаковки по 100 мл

132,5 x 55 мм

Вторичная упаковка лекарственного препарата для ветеринарного применения
Инфлоркс 10% (фасовка 100 мл) не предусмотрена